

CARACTERÍSTICAS

FERTILIZANTE LÍQUIDO FOSFITO DE POTASIO es un compuesto altamente rico en fósforo y potasio y debido a su equilibrada composición favorece las fases de floración y fructificación, fortaleciendo la planta.

Es fácilmente absorbido por vía foliar y radicular, distribuyéndose rápidamente en forma ascendente y descendente.

FERTILIZANTE LÍQUIDO FOSFITO DE POTASIO actúa sobre el sistema hormonal de la planta estimulando la producción de fitoalexinas que potencian las defensas naturales, incrementando la resistencia natural de la planta.

FERTILIZANTE LÍQUIDO FOSFITO DE POTASIO debe aplicarse con un tensioactivo no polar, no iónico, a razón de 0,3 por mil para lograr buen mojado y adherencia.

PRECAUCIONES

- NO MEZCLAR CON ACEITES NI PRODUCTOS CÚPRICOS O DE REACCIÓN ALCALINA.
- NO PULVERIZAR EN HORAS DE GRAN INSOLACIÓN O ALTAS TEMPERATURAS. SE DEBIERA UTILIZAR CON EL AGREGADO DE UN TENSIÓACTIVO (NO POLAR, NO IÓNICO) O JUNTAMENTE CON PLAGUICIDAS.
- LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LA SOLUCIÓN A REGAR NO DEBE SOBREPASAR LOS 2 DS/M.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON COMBUSTIBLES, PRODUCTOS CORROSIVOS O INFLAMABLES, MATERIALES ORGÁNICOS NI CON ALIMENTOS.
- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

La información y recomendaciones que facilitamos son frutos de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en su utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología). Para un correcto asesoramiento, consulte con un Ingeniero Agrónomo.

S. Ando y Cía. S.A.C.I.I.F. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario se responsabilizará por los daños causados por el manejo diferente al observado en esta etiqueta.

LA FERTILIZACIÓN FOLIAR ES COMPLEMENTARIA Y NO SUSTITUTIVA DE LA FERTILIZACIÓN DE BASE (INCORPORADA AL SUELO).

FERTILIZANTE LÍQUIDO

FOSFITO DE POTASIO

LÍQUIDO ACUOSO CONCENTRADO FERTILIZANTE DE SUELO Y FOLIAR

Grado: 0-13-16

Grado equivalente: 0-30-20

COMPOSICIÓN:

fósforo asimilable:	12,90	%
potasio soluble:	16,30	%
agua destilada c.s.p.....	100,00	g

pH: 5,6

ÍNDICE DE ACIDEZ: 57

DENSIDAD: 1,4 g/ml

TENSIÓN SUPERFICIAL: 59,6 dyn/cm

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SENSA N° 13.321

Contenido neto:

Vencimiento*:

N° de lote:

INDUSTRIA ARGENTINA

Registrado, fabricado y distribuido por:



Defensa 540 - (C1065AAJ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4342-4459 (Líneas rotativas) - Fax: (011) 4331-9162
Web site: www.andoycia.com.ar E-mail: info@andoycia.com.ar

RECOMENDACIONES DE USO

La dosis por hectárea varía según cultivo, necesidad y volumen de agua necesario.

DOSIS GENERAL RECOMENDADA: 100-400 cc/100 L de agua.
APLICACIONES Y DOSIS / CONCENTRACIONES DE EMPLEO:

CULTIVO	APLICACIÓN
VID	Foliar: 250 cc/Hl. Aplicar desde brotación a envero.
TRIGO	Foliar: 250 cc/Ha. Acompañando a funguicida previo a antesis.
SOJA	Foliar: 250 cc/Ha. En estado vegetativo a partir de V3 y en estado reproductivo acompañando a funguicida.
FRUTALES: PEPITA CAROZO CÍTRICOS	Foliar: 250-300 cc/Hl. Se recomiendan tres aplicaciones (Septiembre, Enero, Abril) con la planta en crecimiento. Riego: Aplicarlo diluido en el agua de riego a razón de 10 a 15 L/Ha. Repetir el tratamiento 30 días después.
HORTICOLAS FRUTILLA ORNAMENTALES INDUSTRIALES	Foliar: 250 cc/Hl. Aplicar tres a cuatro tratamientos a partir de brotación. Riego: Aplicarlo diluido en el agua de riego a razón de 5 a 10 L/Ha. Repetir el tratamiento 30 días después.
ALMACIGUERAS	Foliar: 200-250 cc/Hl. Riego: En el trasplante: mojado de raíces.
FORESTALES	Foliar: 250 cc/Hl en dos tratamientos. Riego: Disolverlo en agua de riego a razón de 15 cc/ml lineal de vivero. Aumentar 40 cc/pie de árbol grande.
ARÁNDANO	Foliar: 250 cc/Hl. Aplicar desde cuaje a cosecha cada 15 días. Riego: Aplicar de 5 a 15 L/Ha. Realizar 2 aplicaciones en períodos climáticos de excesiva humedad.

COMPATIBILIDADES: FERTILIZANTE LÍQUIDO FOSFITO DE POTASIO es incompatible con formulaciones basados en dicofol, dimetoato, aceites, productos cúpricos y abonos foliares ricos en nitrógeno. Puede ser utilizado una semana antes y tres semanas después de la aplicación de aceites o funguicidas cúpricos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

* 6 meses una vez abierto el envase original.